

図表 2-4-35 自損行為の事故発症時動作別搬送人員

事故発症時動作		年齢層 (歳)											合計	
		0-2	3-5	6-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-64	65-69	70-74		75-
行動・物体作用	外力作用・接触のない動作	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	4
	転倒	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	1	7
	転落・滑落	-	-	1	8	30	18	10	16	4	2	3	8	100
	墜落・飛び降り	-	-	7	30	75	39	44	36	6	10	9	17	273
	轢かれ・踏まれ	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	6
	衝突・ぶつかり	-	-	-	1	18	4	6	2	3	2	-	1	37
	殴打・蹴られ	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-	8
	ひきずられ・引っ張られ	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	噛まれ・引っ掻き	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	埋没・圧迫・押しされ	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	その他行動・作用	-	-	1	-	15	4	1	2	2	-	2	2	29
	不明	-	-	3	1	7	6	8	4	1	1	3	3	37
危険物接触作用 ・ 環境 暴露	刃物・鋭利物	-	-	12	75	276	128	108	122	45	18	29	81	894
	鈍器物	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	5
	銃器・武器	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	高熱固体・燃焼物	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	高熱液体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	高熱気体・燃焼物	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	有毒固体・燃焼物	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	有毒液体・燃焼物	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	有毒気体・燃焼物	-	-	-	2	20	6	2	4	-	2	2	1	39
	電流・感電	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	その他危険物	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
窒息・誤飲・異物	縊首・絞首	-	-	9	29	125	90	106	146	52	27	36	90	710
	窒息・誤飲 (気道)	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	4
	溺水・入水	-	-	-	-	4	1	1	1	1	2	3	6	19
	異物 (食道・消化器)	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	7
	異物 (感覚器官)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	その他窒息・異物	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	6
薬物服用 ・ 吸入・中毒	睡眠薬・鎮痛・鎮静剤	-	-	21	163	651	265	194	146	35	12	24	50	1,561
	麻薬・覚醒剤	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	その他医薬品	-	-	17	95	255	75	59	46	7	4	10	11	579
	消毒剤・洗浄剤	-	-	2	5	10	9	5	8	2	-	3	6	50
	有機溶剤	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	殺虫剤・農薬・除草剤	-	-	-	-	4	1	-	2	-	-	2	1	10
	重金属・腐食剤	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	日常生活用品	-	-	-	2	12	5	1	4	2	-	-	2	28
	自然毒・食中毒	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	4
	その他薬物・中毒	-	-	1	10	31	15	3	10	-	-	1	1	72
自然環境作用	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	4	
その他	-	-	1	2	1	2	1	-	-	1	-	1	9	