


図表3-14 バイスタンダー及び救急隊員等による除細動処置の施行状況

	搬送人員	目撃－除細動 平均時間	心拍 再開数	心拍 再開率	1か月 生存数	1か月 生存率
全除細動事案	1,569	－	501	31.9%	333	21.2%
実施者＝バイスタンダー及び隊員等	123	－	44	35.8%	35	28.5%
うち市民目撃	99	6分21秒	40	40.4%	31	31.3%
実施者＝バイスタンダーのみ	224	－	132	58.9%	96	42.9%
うち市民目撃	182	5分30秒	118	64.8%	90	49.5%
実施者＝隊員等のみ	1,222	－	325	26.6%	202	16.5%
うち隊員目撃	185	3分13秒	98	53.0%	72	38.9%
うち市民目撃	724	16分08秒	187	25.8%	116	16.0%
うち初期心電図＝心室細動等	408	12分20秒	113	27.7%	80	19.6%



「心室細動等」とは、心停止傷病者の心電図測定時の波形が、「心室細動（VF）」又は「心室頻拍（VT）」という致死的不整脈であった場合を指します。これらの波形は、心臓が痙攣し有効な血液量の拍出が得られていない状態を示しており、除細動処置が唯一の救命処置とされ、かつ当該処置が奏効すれば救命の可能性が高いとされています。

医学的に、心室細動等は心停止後の時間の経過とともに心室細動等以外の波形（「無脈性電気的活動（PEA）」「心静止（Asystole）」）に変化し、除細動処置の適応ではなくなると言われています。初期心電図が心室細動等であれば、波形の変化をきたす前に救急隊が傷病者に接触できたことを示す一つの指標となります。