

のどに詰まったものが取り除けないときは、背中を叩いたり胸を圧迫するなどして、とにかく吐き出させます。

① 反応ある乳児に対して、背中を強くたたく方法（背部叩打法）

- 乳児をうつぶせにし、その腹側に腕を通す。
- 指で乳児の下あごを支えて軽く突き出し、上半身がやや低くなるような姿勢にする。
- 手の付け根で両側の肩甲骨の間を4～5回迅速にたたく。

(乳児)



(小児)



② 反応ある乳児に対して、胸骨を圧迫する方法（胸部突き上げ法）

- 背部叩打法で除去できなければ、あおむけにし、胸骨圧迫の要領で、4～5回圧迫する。



(乳児) ①背部叩打法と②胸部突き上げ法を、異物が取れるか、反応がなくなるまで繰り返す。

(小児) ①背部叩打法と腹部突き上げ法※を、異物が取れるか、反応がなくなるまで繰り返す。

※ 背後から両腕を回し、上腹部を斜め上方に圧迫する方法です。

○反応がなくなった場合は、ただちに心肺蘇生を開始してください。

安全・安心情報など様々な情報を掲載しています

東京消防庁ホームページ
<https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp>

東京消防庁 Twitter
@Tokyo_Fire_D

東京消防庁
Facebook

STOP! 子どもの「窒息・誤飲」
東京消防庁

毎年約1,000人の乳幼児が、窒息や誤飲により救急車で運ばれています。窒息は放置すれば死に至る危険な事故です。



窒息や誤飲により重症と診断された事故事例

ビー玉



(3歳 重症)

ミニトマト



(3歳 重症)

バナナ



(1歳 重症)

窒息や誤飲で原因となったものの上位5つです。成長段階によって、窒息や誤飲の多いものが違います。

年齢	順位	1位	2位	3位	4位	5位
0歳		包み・袋	たばこ	その他の玩具	ミルク(乳児用)	電池
		85人	69人	44人	17人	13人
1歳		たばこ	薬剤等	その他の玩具	電池	洗剤等
		49人	35人	27人	21人	17人
2歳		その他の玩具	薬剤等	ビー玉類	魚等の骨	菓子
		23人	18人	12人	12人	11人
3~5歳		アメ玉類	その他の玩具	ビー玉類	魚等の骨	硬貨
		28人	28人	23人	22人	13人

年齢別の窒息や誤飲の原因上位5つ(平成30年中)

飲み込むと危険性が高いものを知っておきましょう

灯油



胃から逆流すると、灯油の蒸気が気管から肺に入り、ひどい肺炎を起こします。

キャンドルオイルもこれと同じ状況で、肺炎を起こします。

ボタン電池



ボタン電池は放電能力が高いため、非常に短時間で消化管壁に潰瘍を作ります。

また、直径が大きく食道にとどまる可能性が高いため、誤飲すると死に至るおそれがあります。

出典：東京都生活文化局消費生活部生活安全課
ボタン型電池 コイン型電池を子どもにさせないで！リーフレット

乳幼児の手の届くところに置いてありませんか？



子どもの窒息や誤飲を防ぐために

家の中は、子どもの目の高さで危険がないかチェックしましょう。

子どもが飲み込めそうなものが、子どもの手の届くところがないか、日頃から整理整頓をこころがけましょう。

【お問合せ先】
東京消防庁防災部防災安全課 ☎ 03-3212-2111（代表）FAX 03-3213-1478



知っておこう！子どもの成長

あなたのお子さんにも、同じような事故が起こる可能性があります！

○ 6か月になったら、何でも口に入れるようになります。

誤飲や窒息が始まる時期を知っておく必要があります。早い子では、5か月から「物をつかむ」、つかんだら「口に入れる」行動が見られます。

乳幼児はトイレットペーパーの芯（39mm）を通る大きさのものなら、口の中に入れてしまい飲み込む危険性があります。

○ 年齢に応じた大きさや形状にして食べさせる、びっくりさせない。

乳幼児は、大きな食べ物を丸飲みにしたり、びっくりして飲み込んでしまい窒息することがあります。

成長段階に応じ、食べ物は適切な大きさに切る、つぶすなどして食べさせ、食事中に大きな声で呼ぶなど乳幼児をびっくりさせるようなことはやめましょう。

乳幼児の日常生活事故防止動画はこちらからご覧になれます。
(YouTube映像)



QRコード

